

島根県におけるバッタ・コオロギ・キリギリス類の記録*

林 成 多

ホシザキグリーン財団, 〒691-0076 島根県出雲市園町沖の島 1659-5

List of Ensifera and Caerifera of Shimane Prefecture, Japan (Insecta: Orthoptera)

Masakazu HAYASHI

Hoshizaki Green Foundation, Okinoshima 1659-5, Sono, Izumo,
Shimane Pref., 691-0076 Japan

Abstract A list of Ensifera and Caerifera of Shimane Prefecture including Oki Islands was given. The data is based on specimens deposited in the Hoshizaki Institute for Wildlife Protection and the references. In total, 112 species are recorded from the prefecture.

Key words : Caerifera, distribution, Ensifera, Oki Islands, Shimane Prefecture

キーワード : コオロギ亜目, バッタ亜目, 分布, 隠岐, 島根県

はじめに

日本直翅類学会(編)による「バッタ・コオロギ・キリギリス大図鑑」(北海道大学出版会)が2006年9月に出版された。これまで国内では、直翅類の本格的な図鑑は出版されたことがなく、きわめて画期的な出版物である。本図鑑によって、これまで分類の専門家でないと同定できなかった多くの種について名前が知ることができるようになり、今後、国内各地で直翅類相の調査が進展することは容易に想像できる。とりわけ、都道府県別の分布表は、各地での解明状況が一目でわかり、調査を行う上で参考になる。

筆者はこの数年間、島根県産の直翅類について写真撮影を中心に観察を行ってきた(林, 2004, 2005, 2006a, b; 林ほか, 2006)。県内では、これまで隠岐諸島を含め、各種調査で直翅類の報告が行われている(例えば、市川・門脇, 1998; 中村

ほか, 2001)。しかし、県産直翅類の網羅的な目録がなく、その必要性を感じていた。そこで、「大図鑑」の目録を基礎として、ホシザキ野生生物研究所蔵の標本、筆者の撮影記録、文献記録を収録して整理を試みた。文献記録の調査は必ずしも十分ではないが、県内で記録のある種はほぼ収録できたと思われる。本資料が今後の調査の参考になれば幸いである。

調査方法

標本記録は、ホシザキ野生生物研究所蔵の標本データを掲載した。いくつかの標本(例えば、三瓶山)は、すでに論文として公表されているものもある。今回、これらの標本についても「大図鑑」の検索を利用して再検討を行った。雌雄が区別できる標本は♂♀記号を、幼虫はLを用いた。筆者の採集データについては、マレーゼトラップ(MT)、フライト・インターセプション・トラップ(FIT)、ライトトラップ(LT)、その他街灯や自動

* ホシザキグリーン財団研究業績 第53号

販売機の明かり（灯火）などの採集方法についても記述した。

鳴き声についても、筆者が確認したいくつかの種について記録をした。

撮影記録は、筆者がこれまでに撮影した生態写真のデータを掲載した。いくつかの写真はすでに報告したものも含まれる。

文献記録は、筆者の知り得た文献を収録したが、必ずしも十分ではない。また、分類学的な変更や細分に関しては、例えばキリギリスの記録はニシキリギリスの記録とみなした。一方、クダマキモドキやウマオイの記録については、近縁種間の区別がなされていないと判断し、収録しなかった。

島根県に生息する種の概要

日本直翅類学会（2006）によれば、隠岐諸島も含めて島根県内には以下の101種が確実に分布しているとされる（一部、未確定種を含む）。この目録は今後、島根県の直翅類相を解明する上で基礎となるものである。

コロギス科 Gryllacrididae

1. コロギス *Prosopogryllacris japonica* (Matsumura et Shiraki)
2. コバネコロギス *Metriogryllacris magnus* (Matsumura et Shiraki)
3. ハネナシコロギス *Nippancistroger testaceus* (Matsumura et Shiraki)

カマドウマ科 Rhaphidophoridae

4. マダラカマドウマ *Diestrammena japonica* Blatchley
5. モリズミウマ *Diestrammena tsushimensis* Storozhenko
6. ハヤシウマ *Distrammena itodo* Sugimoto et Ichikawa
7. コノシタウマ *Distrammena elegantissima* Griffini
8. フトカマドウマ *Distrammena robusta* (Ander)
9. カマドウマ *Atachycines apicalis apicalis* (Brunner von Wattenwyl)

キリギリス科 Tettigoniidae

10. ヤブキリ類 *Tettigonia*

11. ニシキリギリス *Gampsocneis buergeri* (de Haan)
12. ヒメギス *Eopiana engelhardti subtropica* (Bey-Bienko)
13. コバネヒメギス *Chizuella bonneti* (Bolivar)
14. カヤキリ *Pseudorhynchus japonicus* Shiraki
15. クサキリ *Ruspolia lineosa* (Walker)
16. ヒメクサキリ *Ruspolia dubia* (Redtenbacher)
17. クビキリギス *Euconocephalus varius* (Walker)
18. ホシササキリ *Conocephalus maculatus* (le Guillou)
19. ウスイロササキリ *Conocephalus chinensis* (Redtenbacher)
20. オナガササキリ *Conocephalus gladiatus* (Redtenbacher)
21. コバネササキリ *Conocephalus japonicus* (Redtenbacher)
22. フタツトゲササキリ *Conocephalus bambusanus* Ingrisch
23. ハヤシノウマオイ *Hexacentrus hareyamae* Furukawa
24. ハタケノウマオイ *Hexacentrus japonicus* Karny
- ササキリモドキ科 Meconematidae
25. ササキリモドキ *Kuzicus suzukii* (Matsumura et Shiraki)
26. セスジササキリモドキ *Xiphidiopsis subpunctata* (Motschoulsky)
27. ヒメツユムシ *Leptoteraura albicornis* (Motschoulsky)
28. コバネササキリモドキ *Cosmetura fenestrata* Yamasaki
29. ホンシュウフタエササキリモドキ *Tettigoniotsis kurosawai* Yamasaki
30. ハダカササキリモドキ *Tettigoniotsis hiurai* Kanô et Kawakita
- クツワムシ科 Mecopodidae
31. クツワムシ *Mecopoda niponensis* (de Haan)
- ツユムシ科 Phaneropteridae
32. ツユムシ *Phaneroptera falcate* (Poda)
33. アシグロツユムシ *Phaneroptera nigroantennata* Brunner von Wattenwyl

34. セスジツユムシ *Ducetia japonica* (Thunberg)
35. エゾツユムシ *Kuwayamaea sapporensis* Matsumura et Shiraki
36. ホソクビツユムシ *Shirakisotila japonica* (Matsumura et Shiraki)
37. ヒメクダマキモドキ *Thaulula macilenta* Ichikawa
38. サトクダマキモドキ *Holochlora japonica* Brunner von Wattenwyl
39. ヤマクダマキモドキ *Holochlora longifissa* Matsumura et Shiraki
40. ヘリグロツユムシ *Psyra japonica* (Shiraki)
- コオロギ科 Gryllidae**
41. エンマコオロギ *Teleogryllus infernalis* (Saussure)
42. タンボコオロギ *Modycogryllus siamensis* Chopard
43. クマコオロギ *Mitius minor* (Shiraki)
44. モリオカメコオロギ *Loxoblemmus sylves* Matsura
45. ハラオカメコオロギ *Loxoblemmus campesris* Matsura
46. ミツカドコオロギ *Loxoblemmus doenizi* Stein
47. クチナガコオロギ *Velarifictorus asperses* (Walker)
48. ツブレサセコオロギ *Velarifictorus micado* (Saussure)
49. コガタコオロギ *Velarifictorus ornatus* (Shiraki)
50. クマズムシ *Sclerogryllus punctatus* (Brunner von Wattenwyl)
51. クチキコオロギ *Duolandrevus ivani* (Gorochov)
- マツムシ科 Eneopteridae**
52. マツムシ *Xenogryllus marmoratus marmoratus* (de Haan)
53. アオマツムシ *Truljalia hibinonis* (Matsumura)
54. スズムシ *Meloimorpha japonica* (de Haan)
55. カンタン *Oecanthus longicauda* Matsumura
56. ヒロバネカンタン *Oecanthus euryelytra* Ichikawa
57. コガタカンタン *Oecanthus similator* Ichikawa
- ヒバリモドキ科 Trigonidiidae**
58. ヤマトヒバリ *Homoeoxipha opliterata* (Caudell)
59. キンヒバリ *Natula matsururai* Sugimoto
60. クサヒバリ *Svistella bifasciata* (Shiraki)
61. キアシヒバリモドキ *Trigonidium japonicum* Ichikawa
62. ウスモンナギサスズ *Caconemobius takarai* (Ôshiro)
63. ナギサスズ *Caconemobius sazanami* (Furukawa)
64. エゾスズ *Pteronemobius yezoensis* (Shiraki)
65. ヤチスズ *Pteronemobius ohmachii* (Shiraki)
66. ヒメスズ *Pteronemobius nigrescens* (Shiraki)
67. マダラスズ *Dianemobius nigrofasciatus* (Matsumura)
68. ハマスズ *Dianemobius csikii* (Bolivar)
69. シバスズ *Polionemobius Mikado* (Shiraki)
- カネタタキ科 Mogoplistidae**
70. カネタタキ *Ornebius kanetataki* Matsumura
- アリツカコオロギ科 Myrmecophilidae**
71. アリツカコオロギ類 *Myrmecophilus*
- ケラ科 Gryllotalpidae**
72. ケラ *Gryllotalpa orientalis* Burmeister
- ヒシバッタ科 Tetrigidae**
73. トゲヒシバッタ *Criotettix japonicus* (de Haan)
74. ハネナガヒシバッタ *Euparatettix insularis* Bey-Bienko
75. ニセハネナガヒシバッタ *Ergatettix dorsifer* (Walker)
76. コバネヒシバッタ *Formosatettix larvatus* Bey-Bienko
77. ハラヒシバッタ *Tetrix japonica* (Bolivar)
78. ヤセヒシバッタ *Tetrix macilenta* Ichikawa
79. ノセヒシバッタ *Alulatettix fornicatus* (Ichikawa)
- オンブバッタ科 Pyrgomorphidae**
80. オンブバッタ *Atractomorpha lata* (Motschoulsky)
81. ヒメオンブバッタ *Atractomorpha nipponica* Steinmann
- バッタ科 Acrididae**
82. ヤマトフキバッタ *Parapodisma setouchiensis*

Inoue

83. ハネナガフキバツタ *Ognevia longipennis* (Shiraki)
84. ツチイナゴ *Patanga japonica* (Bolivar)
85. ハネナガイナゴ *Oxya japonica* (Thunberg)
86. コバネイナゴ *Oxya yezoensis* Shiraki
87. セグロイナゴ *Shirakiacris chirakii* (Bolivar)
88. ショウリヨウバツタ *Acrida cinerea* (Thunberg)
89. ショウリヨウバツタモドキ *Gonista bicolor* (de Haan)
90. ナキイナゴ *Mongolotettix japonicus* (Bolivar)
91. ヒロバネヒナバツタ *Stenobothrus funatus* Shiraki
92. ヒナバツタ *Glyptobothrus maritimus maritimus* (Mistshenko)
93. イナゴモドキ *Mecostethus parapleurus* (Hagenbach)
94. ツマゲロバツタ *Stethophyma magister* (Rehn)
95. マダラバツタ *Aiolopus thalassinus tamulus* (Fabricius)
96. ヤマトマダラバツタ *Epacromius japonicus* (Shiraki)
97. トノサマバツタ *Locusta migratoria* (Linnaeus)
98. クルマバツタ *Gastrimargus marmoratus* (Thunberg)
99. クルマバツタモドキ *Oedaleus infernalis* Saussure
100. イボバツタ *Trrilophidia japonica* Saussure
101. カワラバツタ *Eusphingonotus japonicus* (Saussure)

標本および文献記録

日本直翅類学会 (2006) の目録の順番に従い、筆者が確認した標本と撮影記録、文献記録を記述する。目録にない種については、番号の代わりに * 印をつけた。

1. コロギス *Prosopogryllacris japonica* (Matsumura et Shiraki)
【標本記録】 1♂, Mt. Sambe, Shimane, 13. VII. 1975,

H. Chikaki leg. [近木 C]. 1♀, Agenogi-cho, Matsue, 22. VII. 1983, H. Chikaki leg. [近木 C]. 1♂, Agenogi-cho, Matsue, 3. VIII. 1984, H. Chikaki leg. [近木 C].

【文献記録】 隠岐島後 (岡田, 1984); 江の川 (中村ほか, 2001).

【県内分布】 本土; 隠岐島後.

2. コバネコロギス *Metriogryllacris magnus* (Matsumura et Shiraki)

島根県では改訂版のレッドデータブックで情報不足に指定され、県内での記録として隠岐や大田市が掲載されている (島根県, 2004).

【文献記録】 隠岐島前 (知夫里島) (富永, 1994); 隠岐島前 (西ノ島) (大浜, 2006).

【県内分布】 本土; 隠岐島前 (西ノ島, 知夫里島).

3. ハネナシコロギス *Nippancistroger testaceus* (Matsumura et Shiraki)

【標本記録】 1♀, 三瓶山室の内 St. 5, 9. VIII. 1991, 大浜祥治 leg. 1♂, 隠岐島後: 五箇村郡川ダム, 7. VIII. 2004, M. Hayashi leg. 3exs., 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 17. -29. VI. 2006, MT, M. Hayashi leg. 1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 29. VI. -8. VII. 2006, MT, M. Hayashi leg.

【撮影記録】 1♂, 隠岐島後: 五箇村郡川ダム, 7. VIII. 2004 (図 1A).

【文献記録】 江津市 (富永, 1992); 三瓶山 (富永, 1992); 邑智町 (富永, 1993); 隠岐島後 (富永, 1994); 三瓶山 (門脇, 1994); 佐田町 (尾原ほか, 2001).

【県内分布】 本土; 隠岐島後.

4. マダラカマドウマ *Diestrammena japonica* Blatchley

【標本記録】 1♀, 大平山, 8. VIII. 1991, LT.

【文献記録】 島根半島 (近木, 1980); 三瓶山 (富永, 1992); 琴引山 (富永, 1993); 三瓶山 (門脇, 1994); 木次町 (近木, 1997); 島根県 (市川, 1997); 江の川 (中村ほか, 2001); 安来市 (藤井, 2003).

【県内分布】 本土; 隠岐? 木村 (1939) による隠岐

の記録は再確認の必要性がある（市川・門脇，1998）。

5. モリズミウマ *Diestrammena tsushimensis* Storozhenko

【文献記録】 隠岐島後（市川，1997）；隠岐島後，隠岐島前（西ノ島）（市川・門脇，1998）；益田市高津川（中村・松田，2005）。

【県内分布】 本土；隠岐島後，島前（西ノ島）。

6. ハヤシウマ *Distrammena itodo* Sugimoto et Ichikawa

【文献記録】 島根県，隠岐（市川，1997）。

【県内分布】 本土；隠岐。

7. コノシタウマ *Distrammena elegantissima* Griffini

【文献記録】 日本直翅類学会（2006）。

【県内分布】 本土；隠岐。

8. フトカマドウマ *Distrammena robusta* (Ander)

【文献記録】 島根県（市川，1997）。

【県内分布】 本土。

9. カマドウマ *Atachycines apicalis apicalis* (Brunner von Wattenwyl)

【文献記録】 木村（1939）による隠岐の記録は同定上の問題がある（市川・門脇，1998）とされたが，その後に記録された（下野・市川，2004）。島根半島（近木，1980）；隠岐島後（下野・市川，2004）。

【県内分布】 本土；隠岐島後。

10. ヤブキリ類 *Tettigonia*

【撮影記録】 1♀，三瓶山北の原，23. IX. 2003。

【文献記録】 島根半島（近木，1980）；瑞穂町（富永，1993）；琴引山（富永，1993）；瑞穂町（尾原，1994）；木次町（近木，1997）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；江の川（中村ほか，2001）；安来市（藤井，2003）；隠岐島後（林ほか，2006）。

【県内分布】 本土；隠岐島後。

11. ニシキリギリス *Gampsocneis buergeri* (de Haan)

【標本記録】 1♂，Mt. Sambe, Shimane, 31. VII. 1981, H. Chikaki leg. [近木 C]。1♀，Agenogi-cho, Matsue, 28. VIII. 1983, H. Yamane leg. [近木 C]。1♀，三瓶山姫逃池 St. 4, 18. X. 1991, 門脇久志 leg. 1♀，隠岐島後：隠岐の島町隠岐高校，7. VIII. 2005, 灯火，M. Hayashi leg. 1♀，出雲市園町沖ノ島，14. VII. 2005, M. Hayashi leg. 1♂，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，5. -17. VIII. 2006, MT, M. Hayashi leg. 1♀，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，9. IX. 2006, M. Hayashi leg.

【撮影記録】 1♂，出雲市園町沖ノ島宍道湖グリーンパーク，15. VIII. 2003。1♂1♀，出雲市園町沖ノ島宍道湖グリーンパーク，14. VII. 2005。

【文献記録】 “キリギリス *Gampsocneis buergeri*”の記録は本種とみなした。島根半島（近木，1980）；三瓶山（富永，1992）；三瓶山（門脇，1994）；木次町（近木，1997）；隠岐島後（市川・門脇，1998）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；松江市（淀江ほか，2000）；江の川（中村ほか，2001）；安来市（藤井，2003）；益田市高津川（中村・松田，2005）；隠岐島後（林ほか，2006）。

【県内分布】 本土；隠岐島後。

12. ヒメギス *Eopiana engelhardti subtropica* (Bey-Bienko)

【標本記録】 1♀，Kushiro-cho Hamada-shi, 22. IX. 1991, K. Obara leg.，1♀，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，5. -17. VIII. 2006, MT, M. Hayashi leg.

【文献記録】 浜田市（富永，1992）；三瓶山（富永，1992）；琴引山（富永，1993）；三瓶山（門脇，1994）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；江の川（中村ほか，2001）；佐田町（尾原ほか，2001）；隠岐島後（林ほか，2006）。

【県内分布】 本土；隠岐島後。

13. コバネヒメギス *Chizuella bonneti* (Bolivar)

【標本記録】 1♀，三瓶山姫逃池 St. 4, 9. VIII. 1991,

淀江賢一郎 leg. 1♀, 大田市三瓶山東の原, 13. VII. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀, 三瓶山北の原 St. 2, 15. VI. 1991, 淀江賢一郎 leg.

【文献記録】隠岐島後（富永, 1994）；三瓶山（富永, 1992）；瑞穂町（富永, 1993）；三瓶山（門脇, 1994）；瑞穂町（尾原, 1994）；斐伊川水系（淀江ほか, 1998）。

【県内分布】本土；隠岐島後。

14. カヤキリ *Pseudorhynchus japonicus* Shiraki

島根県では改訂版のレッドデータブックで情報不足に指定され, 県内の産地として島根半島, 安来市, 江津市, 桜江町, 邑智町, 隠岐が掲載されている（島根県, 2004）。

【標本記録】1♂, 隠岐島後：隠岐の島町隠岐水産高校, 7. VIII. 2006, 灯火, M. Hayashi leg. 1♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 5.-17. VIII. 2006, MT, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1♂, 雲南市加茂町三代橋, 1. VIII. 2005.

【文献記録】島根半島（近木, 1980）；隠岐島後（市川・門脇, 1998）；斐伊川水系（淀江ほか, 1998）；江の川（中村ほか, 2001）；隠岐島後（林ほか, 2006）；平田市, 雲南市加茂町, 斐川町（林, 2006 b）；隠岐島前（西ノ島）（大浜, 2006）。

【県内分布】本土；隠岐島前, 島後（西ノ島）。

15. クサキリ *Ruspolia lineosa* (Walker)

【標本記録】1♂, 三瓶山上多根 St. 13, 7. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1ex., Kitanohara (St. 3) Sanbe-san, 7. VIII. 1991, K. Obara leg. 1♀, 大東町山田（荒井町）, 10. VIII. 2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C]. 1♂, 隠岐島後：下西（西郷）, 8. VIII. 2005, 灯火, M. Hayashi leg. 1♂1♀, 隠岐島後：隠岐の島町南谷, 9. VIII. 2005, LT, M. Hayashi leg. 1♀, 津和野町後田, 10. X. 2005, M. Hayashi leg. 2♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 5.-17. VIII. 2006, MT, M. Hayashi leg. 3♂1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 17.-26. VIII. 2006, MT, M. Hayashi leg. 2♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 26. VIII-9. IX. 2006, MT, M. Hayashi leg. 3♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9. IX. 2006, M. Hayashi

leg.

【文献記録】島根半島（近木, 1980）；三瓶山（富永, 1992）；三瓶山（門脇, 1994）；木次町（近木, 1997）；隠岐島後（市川・門脇, 1998）；斐伊川水系（淀江ほか, 1998）；益田市高津川（松田・中村, 1999）；松江市（淀江ほか, 2000）；江の川（中村ほか, 2001）；隠岐島後（林ほか, 2006）。

【県内分布】本土；隠岐島後。

16. ヒメクサキリ *Ruspolia dubia* (Redtenbacher)

【標本記録】2♂1♀, 斐川町瑞穂大橋斐伊川堤防, 23.-24. VIII. 2005, M. Hayashi leg.

【文献記録】隠岐島後（岡田, 1984）；瑞穂町（富永, 1993）；瑞穂町（尾原, 1994）。

【県内分布】本土；隠岐島後。

* シブイロカヤキリ *Xestophrys javanicus* Redtenbacher

【文献記録】江の川（中村ほか, 2001）；隠岐島前（大浜, 2006）。

【県内分布】本土；隠岐島前（西ノ島）。

17. クビキリギス *Euconocephalus varius* (Walker)

【標本記録】1♀, 浜田市久代町荒相, 27. VII. 1991, 淀江賢一郎 leg.

【撮影記録】1♂, 平田市灘分町沖ノ島, 6. V. 2003. 1♂, 斐川町瑞穂大橋斐伊川堤防, 18. IV. 2004.

【文献記録】島根半島（近木, 1980）；浜田市（富永, 1992）；隠岐島後（市川・門脇, 1998）；斐伊川水系（淀江ほか, 1998）；益田市高津川（松田・中村, 1999）；松江市（淀江ほか, 2000）；江の川（中村ほか, 2001）；安来市（藤井, 2003）；益田市高津川（中村・松田, 2005）。

【県内分布】本土；隠岐島後。

18. ホシササキリ *Conocephalus maculatus* (le Guillou)

【標本記録】1ex., 三瓶山北の原 St. 3, 10. XI. 1991, 門脇久志 leg. 1♂, 三瓶山北の原 St. 3, 7. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1♂, 三瓶山北の原, 27. XI. 1991, K. Yodoe leg. 1♂, 三瓶山北の原 St. 3, 18. X. 1991, 門脇久志 leg. 1♀, 三瓶山西の原 St. 2, 10.




図1 島根県産直翅類の生態写真

A, ハネナシコロギス 2004.8.7 島後; B, ハタケノウマオイ 2004.8.10 平田; C, ササキリモドキ 2003.10.19 平田; D, カヤコオロギ 2003.9.23 三瓶山; E, ハマズ 2005.11.12 大社; F, サトアリヅカコオロギ? 2005.3.27 大社; G, ヤマトマダラバッタ 2005.11.12 大社; H, カワラバッタ 2004.8.21 高津川.

XI.1991, 門脇久志 leg. 1♂1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9.IX.2006, M. Hayashi leg.

【文献記録】浜田市 (富永, 1992); 三瓶山 (富永, 1992); 瑞穂町 (富永, 1993); 三瓶山 (門脇, 1994); 瑞穂町 (尾原, 1994); 隠岐島後 (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 江の川 (中村ほか, 2001); 佐田町 (尾原ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐島後.

19. ウスイロササキリ *Conocephalus chinensis*
(Redtenbacher)

【標本記録】1ex., 三瓶山北の原 St.3, 27.X.1991, 門脇久志 leg. 1ex., 三瓶山北の原 St.3, 10.XI.1991, 門脇久志 leg. 1♂, 大東町山田 (荒井町), 10.VIII.2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C]. 2♂, 大東町山田 (荒井町), 24.IX.2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C].

【文献記録】瑞穂町 (尾原, 1994); 隠岐島後 (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 松江市 (淀江ほか, 2000); 江の川 (中村ほか, 2001); 佐田町 (尾原ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐島後.

20. オナガササキリ *Conocephalus gladiatus*
(Redtenbacher)

【標本記録】1♀, 浜田市国分町海浜公園, 22.IX.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀, Asari-cho Ghotushi, 22.IX.1991, K. Obara leg. 1♀, 三瓶山北の原 St.3, 27.X.1991, 門脇久志 leg. 1♀, 三瓶山西の原 St.2, 10.XI.1991, 門脇久志 leg. 1♀, 三瓶山姫逃池 St.4, 9.VIII.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♂1♀, 斐川町瑞穂大橋斐伊川堤防, 23.-24.VIII.2005, M. Hayashi leg. 1♂, 出雲市島村町島村沈下橋斐伊川, 13.IX.2005. 2♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9.IX.2006, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1♀, 益田市益田川河口, 21.VIII.2004. 1♂, 雲南市加茂町三代橋, 1.VIII.2005. 1♂, 斐川町瑞穂大橋斐伊川堤防, 23.VIII.2005.

【文献記録】浜田市, 江津市 (富永, 1992); 三瓶山 (富永, 1992); 琴引山 (富永, 1993); 隠岐島後, 隠岐島前 (知夫里島) (富永, 1994); 三瓶山 (門脇, 1994); 隠岐島後, 隠岐島前 (西ノ島) (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 松江市 (淀江ほか, 2000); 江の川 (中村ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐島後, 島前 (西ノ島, 知夫里島).

21. コバネササキリ *Conocephalus japonicus*
(Redtenbacher)

【文献記録】三瓶山 (富永, 1992); 瑞穂町 (富永, 1993); 三瓶山 (門脇, 1994); 瑞穂町 (尾原, 1994).

【県内分布】本土; 隠岐? 岡部 (1931, 1950) による隠岐の記録は, 同定上の問題がある (市川・門脇, 1998).

*ササキリ *Conocephalus melaenus* (de Haan)

【標本記録】1♀, Hasumi-mura, Shimane, 22.VIII.1977, H. C. leg. [近木 C].

【文献記録】木次町 (近木, 1997); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 江の川 (中村ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土.

22. フタツトゲササキリ *Conocephalus bambusanus* Ingrisch

【文献記録】益田市 (市川, 1996); 益田市高津川 (松田・中村, 1999).

【県内分布】本土.

23. ハヤシノウマオイ *Hexacentrus hareyamai*
Furukawa

【標本記録】2♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 5.-17.VIII.2006, MT, M. Hayashi leg. 3♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 17.-26.VIII.2006, MT, M. Hayashi leg. 1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 26.VIII.-9.IX.2006, MT, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1♂, 三瓶山北の原, 23.IX.2003. 1♂, 隠岐島後: 五箇村郡川ダム, 7.VIII.2004.

【文献記録】隠岐島後, 隠岐島前(西ノ島) (市川・門脇, 1998).

【県内分布】本土; 隠岐島後, 島前 (西ノ島).

24. ハタケノウマオイ *Hexacentrus japonicus* Karny

島根県では改訂版のレッドデータブックで情報不足に指定されている (島根県, 2004).

【鳴き声】出雲市灘分町, 5.VIII.2006, 6.VIII.2006, 7.VIII.2006, 10.VIII.2006, 11.VIII.2006, 12.VIII.2006, 15.VIII.2006, 16.VIII.2006, 17.VIII.2006, 25.VIII.2006, 30.VIII.2006, 8.VIII.2006. 出雲市灘分町では, 2004年は7月25日~9月11日, 2005年は8月2日~8月22日に確認している (林, 2005, 2006b).

【撮影記録】1♂, 平田市灘分町中ノ須, 10.VIII.2004 (図1B).

【文献記録】“ウマオイ *Hexacentrus japonicus*”の記録は本記録に含めていない. 隠岐島前 (知夫里島) (富永, 1994); 益田市高津川 (中村・松田, 2005); 平田市, 隠岐島後 (林, 2005); 隠岐島後 (林ほか, 2006); 出雲市, 松江市, 斐川町 (林, 2006b).

【県内分布】本土; 隠岐島後, 島前 (知夫里島).

25. ササキリモドキ *Kuzicus suzukii* (Matsumura et Shiraki)

【撮影記録】1♂, 平田市三津町中村, 19.X.2003 (図1C).

【文献記録】隠岐島後 (富永, 1994); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐島後.

26. セスジササキリモドキ *Xiphidiopsis subpunctata* (Motschoulsky)

【文献記録】三瓶山 (富永, 1992); 三瓶山 (門脇, 1994).

【県内分布】本土.

27. ヒメツユムシ *Leptotectura albicornis* (Motschoulsky)

【標本記録】1♂, 三べ北の原, 9.IX.1991, 大畑 leg. 2♂, 隠岐島後: 隠岐の島町南谷, 9.VIII.2005, LT, M. Hayashi leg.

【文献記録】三瓶山 (富永, 1992); 瑞穂町, 琴引山 (富永, 1993); 隠岐島後 (富永, 1994); 三瓶山 (門脇, 1994); 瑞穂町 (尾原, 1994); 隠岐島後 (市川・門脇, 1998).

【県内分布】本土; 隠岐島後.

28. コバネササキリモドキ *Cosmetura fenestrata* Yamasaki

【文献記録】日本直翅類学会 (2006).

【県内分布】本土; 隠岐.

29. ホンシュウフタエササキリモドキ *Tettigoniotsis kurosawai* Yamasaki

【文献記録】日本直翅類学会 (2006).

【県内分布】本土.

30. ハダカササキリモドキ *Tettigoniotsis hiurai* Kanô et Kawakita

【文献記録】瑞穂町 (富永, 1993); 瑞穂町 (尾原, 1994).

【県内分布】本土.

31. クツワムシ *Mecopoda niponensis* (de Haan)

島根県では改訂版のレッドデータブックで準絶滅危惧に指定されている (島根県, 2004).

【標本記録】1♂, Kaihin-koen Hamada-shi, 22.IX.1991, K. Obara leg. 3♂, 浜田市国分町海浜公園, 22.IX.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀, 浜田市国分町海浜公園, 22.IX.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♂, 大東町山田 (荒井町), 24.VIII.2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C].

【撮影記録】1♂, 隠岐島後: 西郷町男池, 6.VIII.2004. 1♂, 益田市益田川河口, 21.VIII.2004. 2♂, 斐川町瑞穂大橋斐伊川堤防, 23.VIII.2005.

【文献記録】島根半島 (近木, 1980); 浜田市 (富永, 1992); 隠岐島前 (知夫里島) (富永, 1994); 木次町 (近木, 1997); 隠岐島前(西ノ島) (市川・

門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 江の川 (中村ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005); 隠岐島後, 益田市 (林, 2005); 隠岐島後 (林ほか, 2006); 出雲市, 斐川町 (林, 2006b).

【県内分布】本土; 隠岐島後, 島前 (西ノ島, 知夫里島).

32. ツユムシ *Phaneroptera falcate* (Poda)

【標本記録】1ex., 三瓶山姫逃池 St. 4, 9. VIII. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1ex., Kushiro-cho Hamada-shi, 22. IX. 1991, K. Obara leg. 1ex., Mt. Sanbe, 13. VIII. 1991, Y. Maeta leg. 1♂, 三瓶山北の原 St. 3, 7. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀, 三瓶山北の原 St. 3, 7. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9. IX. 2006, M. Hayashi leg. 1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9. - 29. IX. 2006, MT, M. Hayashi leg. 2♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 29. IX. - 26. X. 2006, MT, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1♀, 出雲市鹿園寺町町境川, 3. XI. 2005.

【文献記録】島根半島 (近木, 1980); 三瓶山 (富永, 1992); 瑞穂町 (富永, 1993); 三瓶山 (門脇, 1994); 瑞穂町 (尾原, 1994); 木次町 (近木, 1997); 隠岐島後 (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 江の川 (中村ほか, 2001); 佐田町 (尾原ほか, 2001); 安来市 (藤井, 2003); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐島後.

33. アシゲロツユムシ *Phaneroptera nigroantennata* Brunner von Wattenwyl

【標本記録】1ex., 浜田市久代町荒相, 22. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1ex., 三瓶山北の原 St. 3, 27. X. 1991, 門脇久志 leg. 1♀, 浜田市久代町荒相, 27. VII. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀, Kushiro-cho Hamada-shi, 22. IX. 1991, K. Obara leg.

【撮影記録】1♂, 三瓶山北の原, 23. IX. 2003.

【文献記録】瑞穂町 (富永, 1993); 琴引山 (富永, 1993); 瑞穂町 (尾原, 1994); 隠岐島後 (市川・

門脇, 1998); 江の川 (中村ほか, 2001).

【県内分布】本土; 隠岐島後.

34. セスジツユムシ *Ducetia japonica* (Thunberg)

【標本記録】1♂, 斐川町瑞穂大橋斐伊川堤防, 23. - 24. VIII. 2005, M. Hayashi leg. 1♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9. - 29. IX. 2006, FIT, M. Hayashi leg. 2♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 29. IX. - 26. X. 2006, MT, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 31. X. 2006.

【文献記録】島根半島 (近木, 1980); 隠岐島後 (富永, 1994); 木次町 (近木, 1997); 隠岐島後, 隠岐島前 (西ノ島) (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 江の川 (中村ほか, 2001); 安来市 (藤井, 2003); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐島後, 島前 (西ノ島).

35. エゾツユムシ *Kuwayamaea sapporensis* Matsumura et Shiraki

【文献記録】斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐島後.

36. ホソクビツユムシ *Shirakisotila japonica* (Matsumura et Shiraki)

【文献記録】琴引山 (富永, 1993); 瑞穂町 (尾原, 1994).

【県内分布】本土.

37. ヒメクダマキモドキ *Thaulula macilenta* Ichikawa

【文献記録】益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土.

38. サトクダマキモドキ *Holochlora japonica* Brunner von Wattenwyl

【標本記録】1♀, Nishikawatsu, Matsue, 9. IX. 1983, Furusho leg. [近木 C]. 1ex., 浜田市久代町荒相, 22. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀, 大東町山田 (荒

井町), 10.VIII.2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C]. 1♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 27.VIII.2005, M. Hayashi leg.

【文献記録】“クダマキモドキ *Holochlora japonica*”の記録は含めていない. 邑智町 (富永, 1993); 隠岐島前 (知夫里島) (富永, 1994); 江の川 (中村ほか, 2001); 佐田町 (尾原ほか, 2001).

【県内分布】本土; 隠岐島前 (知夫里島).

39. ヤマクダマキモドキ *Holochlora longifissa*
Matsumura et Shiraki

【標本記録】2♂, Tanoura, Shimane Pref., 9. IX. 1979, Y. Oka leg. [近木 C]. 1ex., 三瓶山大平山 St. 8, 7. IX. 1991, 大島・尾原・三島・大浜 leg. 2♂, 三瓶山北の原 St. 3, 7. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 3♂, 三瓶山上多根 St. 13, 7. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1♂, 江津市浅利町奥口, 22. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9. IX. 2006, M. Hayashi leg.

【文献記録】三瓶山 (富永, 1992); 瑞穂町 (富永, 1993); 三瓶山 (門脇, 1994); 瑞穂町 (尾原, 1994); 江の川 (中村ほか, 2001).

【県内分布】本土.

40. ヘリグロツユムシ *Psyrana japonica* (Shiraki)

【標本記録】1ex., Kitanohara (St. 3) Sanbe-san, 7. VIII. 1991, K. Obara leg. 1♂, 隠岐島後: 隠岐の島町南谷, 9. VIII. 2005, LT, M. Hayashi leg.

【文献記録】瑞穂町 (尾原, 1994); 隠岐島後 (市川・門脇, 1998); 隠岐島後 (林ほか, 2006).

【県内分布】本土; 隠岐島後.

41. エンマコオロギ *Teleogryllus infernalis*
(Saussure)

【標本記録】1♀, Tano-ura B, Shimane, 9. IX. 1979, Y. Oka leg. [近木 C]. 1♂, 浜田市国分町海浜公園, 22. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 3♂, 三瓶山上多根 St. 13, 7. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀, 浜田市国分町海浜公園, 22. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀, 浜田市久代町荒相, 22. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀, 三瓶山北の原 St. 3, 27. X. 1991, 門脇久志 leg. 1♀, 三瓶山西の原 St. 2, 10. XI. 1991, 門脇久

志 leg. 1♂, 隠岐島後: 隠岐の島町隠岐水産高校, 7. VIII. 2006, 灯火, M. Hayashi leg. 1♂, 出雲市園町沖ノ島, 29. VIII. 2005, 灯火, M. Hayashi leg. 1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9. IX. 2006, M. Hayashi leg.

【鳴き声】出雲市灘分町, 15. VIII. 2006. このシーズンで初めて確認された鳴き声.

【撮影記録】1♂, 平田市園町沖ノ島, 3. X. 2003.

【文献記録】島根半島 (近木, 1980); 三瓶山 (富永, 1992); 瑞穂町, 琴引山, 邑智町 (富永, 1993); 隠岐島後, 隠岐島前 (知夫里島) (富永, 1994); 三瓶山 (門脇, 1994); 瑞穂町 (尾原, 1994); 木次町 (近木, 1997); 隠岐島後, 隠岐島前 (西ノ島, 知夫里島) (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 松江市 (淀江ほか, 2000); 江の川 (中村ほか, 2001); 安来市 (藤井, 2003); 隠岐島前 (西ノ島) (下野・市川, 2004); 益田市高津川 (中村・松田, 2005); 隠岐島後 (林ほか, 2006).

【県内分布】本土; 隠岐島後, 島前 (西ノ島, 知夫里島).

42. タンボコオロギ *Modycogryllus siamensis*
Chopard

【標本記録】1♂, 平田市灘分町中ノ須, 23. VIII. 2004, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1♂, 平田市灘分町中ノ須, 19. VI. 2004.

【文献記録】隠岐島後 (直翅類研究グループ, 1983); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 江の川 (中村ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐島後.

43. クマコオロギ *Mitius minor* (Shiraki)

【標本記録】1♂, 斐伊町瑞穂大橋斐伊川堤防, 23.-24. VIII. 2005, M. Hayashi leg.

【文献記録】隠岐島後 (岡田, 1984); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 江の川 (中村ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐島後.

*ヒメコオロギ *Comidogryllus nipponensis*
(Shiraki)

【標本記録】江の川（中村ほか，2001）.

【県内分布】本土.

44. モリオカメコオロギ *Loxoblemmus sylves* Matsuura

【標本記録】2♂，浜田市久代町荒相，22.IX.1991，淀江賢一郎 leg. 1♂，三瓶山上多根 St.13, 7. IX. 1991，淀江賢一郎 leg. 1♂，三瓶山北の原 St.3, 18. X.1991，門脇久志 leg. 1♂，三瓶山姫逃池 St.4, 18. X.1991，門脇久志 leg. 1♂，三べ北の原，9. IX. 1991，大畑 leg. 2♀，三べ北の原，9. IX.1991，大畑 leg. 1♀，三瓶山上多根 St.13, 7. IX.1991，淀江賢一郎 leg. 1♀，久代町荒相，22.IX.1991，淀江賢一郎 leg. 1♂，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，26.VIII. -9.IX.2006，MT, M. Hayashi leg. 1♂，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，26.VIII. -9.IX.2006，FIT, M. Hayashi leg. 2♂，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，9.IX.2006，M. Hayashi leg.
【文献記録】浜田市，三瓶山（富永，1992）三瓶山（門脇，1994）；隠岐島後（市川・門脇，1998）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；隠岐島後（下野・市川，2004）；益田市高津川（中村・松田，2005）.
【県内分布】本土；隠岐島後.

45. ハラオカメコオロギ *Loxoblemmus campesris* Matsuura

【標本記録】1♂，斐川町瑞穂大橋斐伊川堤防，23. -24. VIII. 2005，M. Hayashi leg.
【文献記録】島根半島（近木，1980）；隠岐島後，隠岐島前（西ノ島，知夫里島）（市川・門脇，1998）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；松江市（淀江ほか，2000）；益田市高津川（中村・松田，2005）；隠岐島後（林ほか，2006）.
【県内分布】本土；隠岐島後，島前（西ノ島，知夫里島）.

*タンボオカメコオロギ *Loxoblemmus aomoriensis* Shiraki

【文献記録】江の川（中村ほか，2001）；益田市高

津川（中村・松田，2005）.

【県内分布】本土.

46. ミツカドコオロギ *Loxoblemmus doenizi* Stein

【標本記録】1♂，大東町山田（荒井町），2.VIII. 2003，H. Kadowaki leg. [門脇 C].

【文献記録】島根半島（近木，1980）；木次町（近木，1997）；隠岐島前（西ノ島）（市川・門脇，1998）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；益田市高津川（中村・松田，2005）.

【県内分布】本土；隠岐島前（西ノ島）.

47. クチナガコオロギ *Velarifictorus asperses* (Walker)

【文献記録】日本直翅類学会（2006）.

【県内分布】本土.

48. ツツレサセコオロギ *Velarifictorus micado* (Saussure)

【文献記録】島根半島（近木，1980）；瑞穂町（尾原，1994）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；松江市（淀江ほか，2000）；江の川（中村ほか，2001）；安来市（藤井，2003）；益田市高津川（中村・松田，2005）.
【県内分布】本土；隠岐？ 木村（1939）と岡部（1950）による隠岐の記録は再確認の必要性がある（市川・門脇，1998）.

49. コガタコオロギ *Velarifictorus ornatus* (Shiraki)

【文献記録】日本直翅類学会（2006）.

【県内分布】本土.

*カマドコオロギ *Gryllodes sigillatus* (Walker)

【文献記録】島根半島（近木，1980）.

【県内分布】本土.

50. クマスズムシ *Sclerogryllus punctatus* (Brunner von Wattenwyl)

【標本記録】1♂，浜田市下府町，22.IX.1991，LT，尾原・西田・淀江 leg. 1♀，津和野町笹山，11.

X. 2005, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1♂, 出雲市大社町湊原, 29. IX. 2005.

【文献記録】浜田市 (富永, 1992); 隠岐島前 (西ノ島) (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐島前 (西ノ島).

51. クチキコオロギ *Duolandrevus ivani* (Gorochov)

【標本記録】1♀, 平田市奥宇賀町和田上, 25.

X. 2003, M. Hayashi leg.

【文献記録】益田市 (山田, 2004); 隠岐島後 (島田, 2004); 平田市 (林, 2004); 隠岐島前 (西ノ島) (大浜, 2006).

【県内分布】本土; 隠岐島後, 島前 (西ノ島).

52. マツムシ *Xenogryllus marmoratus marmoratus* (de Haan)

【標本記録】1♀, 出雲市灘分町中ノ須, 4. IX. 2005, M. Hayashi leg. 1♂, 斐川町瑞穂大橋斐伊川堤防, 23. -24. VIII. 2005, M. Hayashi leg. 1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9. IX. 2006, M. Hayashi leg.

【鳴き声】出雲市灘分町, 19. VIII. 2006. このシーズンで初めて確認された鳴き声.

【撮影記録】1♂, 木次町木次健康の森, 20. IX. 2003. 1♂, 平田市平田森林公園, 22. IX. 2003. 1♂, 斐川町瑞穂大橋斐伊川堤防, 23. VIII. 2005.

【文献記録】島根半島 (近木, 1980); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 江の川 (中村ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐? 木村 (1932, 1939) と岡部 (1931) による隠岐の記録は再確認の必要性がある (市川・門脇, 1998).

53. アオマツムシ *Truljalia hibinonis* (Matsumura)

【標本記録】1♂, 大東町山田 (荒井町), 24. IX. 2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C]. 1♀, 出雲市園町沖ノ島, 29. VIII. 2005, M. Hayashi leg. 1♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 20. IX. 2005, 足立容

子 leg. 1♂, 出雲市園町沖ノ島宍道湖グリーンパーク, 28. IX. 2006, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1♂, 平田市園町沖ノ島, 19. IX. 2003.

【文献記録】木次町 (近木, 1997); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 安来市 (藤井, 2003); 隠岐島前 (西ノ島) (下野・市川, 2004); 益田市高津川 (中村・松田, 2005); 隠岐島前 (島田, 2004); 隠岐島前 (大浜, 2006).

【県内分布】本土; 隠岐島後, 島前 (西ノ島).

* マツムシモドキ *Aphonoides japonicus* (Shiraki)

【文献記録】江の川 (中村ほか, 2001).

【県内分布】本土.

* カヤコオロギ *Euscirtus japonicus* Shiraki

島根県では改訂版のレッドデータブックで情報不足に指定され, 県内での産地として瑞穂町が掲載されている (島根県, 2004).

【撮影記録】1♂, 三瓶山北の原, 23. IX. 2003 (図1D).

【文献記録】瑞穂町 (尾原, 1994); 三瓶山 (林, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐? 木村 (1939) による隠岐の記録は, 同定上の問題がある (市川・門脇, 1998).

54. スズムシ *Meloimorpha japonica* (de Haan)

【文献記録】島根半島 (近木, 1980); 木次町 (近木, 1997); 隠岐島前 (知夫里島) (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 江の川 (中村ほか, 2001); 隠岐島後 (下野・市川, 2004); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐島後, 島前 (知夫里島).

55. カンタン *Oecanthus longicauda* Matsumura

【標本記録】1ex., 三瓶山北の原 St. 3, 7. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg. 1♂, 三瓶山北の原 St. 3, 7. IX. 1991, 淀江賢一郎 leg.

【撮影記録】1♂, 三瓶山北の原, 23. IX. 2003. 1♀, 平田市三津町中村, 19. X. 2003. 1♀, 隠岐島

後：五箇村郡川ダム，7. VIII. 2004.

【文献記録】島根半島（近木，1980）；三瓶山（富永，1992）；瑞穂町（富永，1993）；隠岐島後，隠岐島前（知夫里島）（富永，1994）；三瓶山（門脇，1994）；瑞穂町（尾原，1994）；隠岐島後（市川・門脇，1998）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；松江市（淀江ほか，2000）；江の川（中村ほか，2001）；益田市高津川（中村・松田，2005）.

【県内分布】本土；隠岐島後，島前（知夫里島）.

56. ヒロバネカントン *Oecanthus euryelytra*

Ichikawa

【標本記録】1♂，大社町神戸川河口右岸，25. VII. 2005, M. Hayashi leg.

【文献記録】益田市高津川（中村・松田，2005）.

【県内分布】本土.

57. コガタカントン *Oecanthus similator* Ichikawa

【文献記録】日本直翅類学会（2006）.

【県内分布】本土.

58. ヤマトヒバリ *Homoeoxipha opliterata*

(Caudell)

【文献記録】隠岐島前（知夫里島）（富永，1994）.

【県内分布】隠岐島前（知夫里島）.

59. キンヒバリ *Natula matsuurai* Sugimoto

【文献記録】斐伊川水系（淀江ほか，1998）；松江市（淀江ほか，2000）.

【県内分布】本土.

60. クサヒバリ *Svistella bifasciata* (Shiraki)

【標本記録】1♂，Asari-cho Ghotu-shi，22. IX. 1991, K. Obara leg. 1♂，大東町山田（荒井町），26. VIII. 2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C]. 5♂2♀，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，9. -29. IX. 2006, MT, M. Hayashi leg. 5♀，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，29. IX. -26. X. 2006, MT, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1♂，平田市平田森林公園，22. IX. 2003. 1♀，益田市益田川河口，21. VIII. 2004.

【文献記録】島根半島（近木，1980）；江津市（富永，1992）；隠岐島前（西ノ島）（市川・門脇，1998）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；江の川（中村ほか，2001）；安来市（藤井，2003）；益田市高津川（中村・松田，2005）.

【県内分布】本土；隠岐島前（西ノ島）.

61. キアシヒバリモドキ *Trigonidium japonicum*

Ichikawa

【撮影記録】1♂，平田市園町沖ノ島，13. IX. 2004.

【文献記録】隠岐島後（直翅類研究グループ，1983）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；江の川（中村ほか，2001）.

【県内分布】本土；隠岐島後.

62. ウスモンナギサスズ *Caconemobius takarai*

(Ôshiro)

【文献記録】益田市（山田，2004）；隠岐（日本直翅類学会，2006）.

【県内分布】本土；隠岐.

63. ナギサスズ *Caconemobius sazanami* (Furukawa)

別名ウミコオロギ. 海岸の岩礁地帯に広く分布していると考えられる.

【標本記録】2♀，出雲市猪目町猪目，1. X. 2005, M. Hayashi leg. 1♀，出雲市河下町河下，1. X. 2005, M. Hayashi leg.

【文献記録】多伎町（市川，1997）；益田市（山田，2004）；出雲市（林，2006a）；隠岐島後（林ほか，2006）.

【県内分布】本土；隠岐島後.

64. エゾスズ *Pteronemobius yezoensis* (Shiraki)

【標本記録】1♀，三瓶山北の原 St. 3, 18. X. 1991, 門脇久志 leg.

【文献記録】三瓶山（富永，1992）；瑞穂町，琴引山（富永，1993）；三瓶山（門脇，1994）；瑞穂町（尾原，1994）.

【県内分布】本土.

65. ヤチスズ *Pteronemobius ohmachi* (Shiraki)
【標本記録】1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9. IX. 2006, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1♀, 出雲市唐川町唐川, 30. X. 2005.
【文献記録】瑞穂町 (富永, 1993); 瑞穂町 (尾原, 1994); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 松江市 (淀江ほか, 2000); 江の川 (中村ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土.

66. ヒメスズ *Pteronemobius nigrescens* (Shiraki)

【文献記録】隠岐島前 (西ノ島) (下野・市川, 2004).

【県内分布】隠岐島前 (西ノ島).

67. マダラスズ *Dianemobius nigrofasciatus* (Matsumura)

【標本記録】1L, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9. IX. 2006, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1♂, 平田市園町沖ノ島, 3. X. 2003.
【文献記録】瑞穂町 (富永, 1993); 隠岐島後 (富永, 1994); 瑞穂町 (尾原, 1994); 隠岐島後 (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 江の川 (中村ほか, 2001); 佐田町 (尾原ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐島後.

68. ハマスズ *Dianemobius csikii* (Bolívar)

島根県では改訂版のレッドデータブックで情報不足に指定され, 県内での産地として多伎町が掲載されている (島根県, 2004).

【標本記録】1♀, 出雲市大社町神戸川河口右岸, 29. IX. 2005.

【撮影記録】1♂, 出雲市大社町神戸川河口右岸, 12. IX. 2005 (図 1E).

【文献記録】多伎町 (矢代・市川, 2002); 大社町 (林, 2005); 出雲市大社町 (林, 2006b).

【県内分布】本土.

*カワラスズ *Dianemobius furumagiensis* (Ohmachi et Furukawa)

【文献記録】益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土.

69. シバスズ *Polionemobius Mikado* (Shiraki)

【撮影記録】1♂, 木次町木次健康の森, 20. IX. 2003.

【文献記録】瑞穂町 (尾原, 1994); 隠岐島後, 隠岐島前 (西ノ島) (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 松江市 (淀江ほか, 2000); 江の川 (中村ほか, 2001); 佐田町 (尾原ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005); 隠岐島後 (林ほか, 2006).

【県内分布】本土; 隠岐島後, 島前 (西ノ島).

*ヒゲジロスズ *Polionemobius flavoantennalis* (Shiraki)

【文献記録】江の川 (中村ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土.

70. カネタタキ *Ornebius kanetataki* Matsumura

【標本記録】1♀, 益田市益田川河口, 21. VIII.

2004. 1♂1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9. IX. 2006, M. Hayashi leg. 1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 29. IX. -26. X. 2006, MT, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1♂, 益田市益田川河口, 21. VIII.

2004. 1♀, 松江市城山, 24. X. 2005.

【文献記録】島根半島 (近木, 1980); 木次町 (近木, 1997); 隠岐島後 (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 江の川 (中村ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐島後.

71. アリツカコオロギ類 *Myrmecophilus*

【標本記録】筆者は県内で2個体を採集している:

1♀, 出雲市大社町稲佐の浜, 27. III. 2006 (トビイロシワアリ), M. Hayashi leg. (図 1F). 砂浜上

に置いてあった砂袋を動かすと、トビイロシワアリのコロニーがあり、俊敏に動きまわるアリヅカコオロギを採集した。この個体は体長2mm以下であるが、成虫とみられること（体表に鱗毛が多い）と寄主のアリから、サトアリヅカコオロギ *M. tetramorii* Ichikawa に同定される可能性が高い。

1ex. (幼虫), 出雲市園町宍道湖グリーンパーク, 26.IV.2005 (アミメアリ), M. Hayashi leg. 朽ちた木製ベンチを撤去中にアミメアリと一緒に採集した。この個体は体長2mm以下で体表面に鱗毛がなく、幼虫である。

【県内分布】 本土。

72. ケラ *Gryllotalpa orientalis* Burmeister

【撮影記録】 1ex., 平田市灘分町中ノ須, 23.IX.2003. 1ex., 平田市園町沖ノ島宍道湖グリーンパーク, 19.IX.2004.

【文献記録】 島根半島 (近木, 1980); 隠岐島後 (富永, 1994); 木次町 (近木, 1997); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 江の川 (中村ほか, 2001); 安来市 (藤井, 2003); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】 本土; 隠岐島後。

* ノミバツタ *Xya japonica* (de Haan)

【文献記録】 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 江の川 (中村ほか, 2001).

【県内分布】 本土; 隠岐? 木村 (1931) による隠岐の記録は、同定上の問題がある (市川・門脇, 1998).

73. トゲヒシバツタ *Criotettix japonicus* (de Haan)

【標本記録】 1♂1♀, 雲南市大東町上組, 16.IV.2005, M. Hayashi leg. 1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 27.IV.-2.V.2006, FIT, M. Hayashi leg. 1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 27.IV.-2.V.2006, MT, M. Hayashi leg. 1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 8.-13.V.2006, FIT, M. Hayashi leg. 1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 19.V.-5.VI.2006, FIT, M. Hayashi leg.

【撮影記録】 1ex., 雲南市木次町ふるさと尺の内公

園, 28.IV.2005.

【文献記録】 島根半島 (近木, 1980); 邑智町 (富永, 1993); 大東町, 邑智町, 江の川, 平田市, 斐伊川 (市川, 1995); 隠岐島後 (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 松江市 (淀江ほか, 2000); 江の川 (中村ほか, 2001); 佐田町 (尾原ほか, 2001); 安来市 (藤井, 2003); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】 本土; 隠岐島後。

74. ハネナガヒシバツタ *Euparatettix insularis* Bey-Bienko

【標本記録】 1ex., Agenogi-cho, Matsue, 9.VIII.1978, H. Chikaki leg. [近木 C]. 2exs., 出雲市園町沖ノ島宍道湖グリーンパーク, 11.VII.2004, M. Hayashi leg. 1ex., 出雲市園町沖ノ島宍道湖グリーンパーク, 3.IX.2005, M. Hayashi leg.

【文献記録】 島根半島 (近木, 1980); 浜田市 (富永, 1992); 三瓶山 (門脇, 1994); 飯梨川, 中海, 斐伊川, 大橋川, 松江市, 大田市, 三瓶山, 大東町, 琴引山, 邑智町, 江の川, 隠岐島後, 隠岐島前 (西ノ島) (市川, 1995); 隠岐島後, 隠岐島前 (西ノ島) (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 松江市 (淀江ほか, 2000); 江の川 (中村ほか, 2001); 佐田町 (尾原ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】 本土; 隠岐島後, 島前 (西ノ島)。

75. ニセハネナガヒシバツタ *Ergatettix dorsifer* (Walker)

【文献記録】 三瓶山 (富永, 1992); 江の川, 浜田市, 斐伊川, 飯梨川, 宍道湖 (市川, 1995); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 江の川 (中村ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】 本土。

76. コバネヒシバツタ *Formosatettix larvatus* Bey-Bienko

【標本記録】 1♂, 奥出雲町玉峰森林公園, 30.IV.2005, M. Hayashi leg.

【文献記録】隠岐島後（岡田，1984）；瑞穂町（富永，1993）；瑞穂町（尾原，1994）；松江市（市川，1995）；佐田町（尾原ほか，2001）。

【県内分布】本土；隠岐島後。

77. ハラヒシバッタ *Tetrix japonica* (Bolívar)

【標本記録】1♀，出雲市園町沖ノ島穴道湖グリーンパーク，7.IV.2005, M. Hayashi leg. 2♀，出雲市園町沖ノ島穴道湖グリーンパーク，11.VI.2005, M. Hayashi leg.

【文献記録】“ヒシバッタ *Tetrix japonica*”の記録も本種とみなした。島根半島（近木，1980）；瑞穂町（富永，1993）；瑞穂町（尾原，1994）；赤来町，頓原町（琴引山，大万木山），松江市，大東町，木次町，三瓶山，邑智町，中海，斐伊川，飯梨川，穴道湖，江の川（市川，1995）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；松江市（淀江ほか，2000）；江の川（中村ほか，2001）；佐田町（尾原ほか，2001）；安来市（藤井，2003）；益田市高津川（中村・松田，2005）。

【県内分布】本土；隠岐？岡部（1931, 1950）による隠岐の記録は，同定上の問題がある（市川・門脇，1998）。

78. ヤセヒシバッタ *Tetrix macilentata* Ichikawa

【文献記録】三瓶山（富永，1992）；瑞穂町（富永，1993）；隠岐島後，隠岐島前（知夫里島）（富永，1994）；三瓶山（門脇，1994）；瑞穂町（尾原，1994）；大東町，木次町，邑智町，赤来町，松江市，隠岐島後，隠岐島前（西ノ島，知夫里島）（市川，1995）；隠岐島後，隠岐島前（西ノ島）（市川・門脇，1998）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；隠岐島前（西ノ島）（下野・市川，2004）。

【県内分布】本土；隠岐島後，島前（西ノ島，知夫里島）。

* ヒメヒシバッタ *Tetrix minor* Ichikawa

【文献記録】三瓶山，邑智町，瑞穂町，隠岐島後（市川，1995）。

【県内分布】本土；隠岐島後。

（モリヒシバッタ *Tetrix silvicultrix* Ichikawa）

これまで島根県では確認されていないが，鳥取県や岡山県で記録されており，発見される可能性のある種である。

【文献記録】尾原（1994）によって瑞穂町から報告されたモリヒシバッタは，ヒメヒシバッタとされた（市川，1995）。

79. ノセヒシバッタ *Alulatettix fornicatus* (Ichikawa)

【標本記録】5♂5♀，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，5.-17.VI.2006, FIT, M. Hayashi leg. 1♂，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，19.V.-5.VI.2006, FIT, M. Hayashi leg. 2♂1♀，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，17.-29.VI.2006, FIT, M. Hayashi leg. 2♂，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，29.VI.-8.VII.2006, FIT, M. Hayashi leg. 5♂，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，8.-22.VII.2006, FIT, M. Hayashi leg. 2♂，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，22.VII.-5.VIII.2006, FIT, M. Hayashi leg.

【文献記録】松江市，大万木山，隠岐島後（市川，1995）；隠岐島後（市川・門脇，1998）；江の川（中村ほか，2001）；隠岐島後（林ほか，2006）。

【県内分布】本土；隠岐島後。

80. オンブバッタ *Atractomorpha lata* (Motschoulsky)

【標本記録】1♀，Asari-cho Ghotu-shi，22.IX.1991, K. Obara leg. 1♂，Kaihin-koen Hamada-shi，22.IX.1991, K. Obara leg. 1♂，浜田市久代町荒相，27.VII.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀，大東町山田（荒井町），10.VIII.2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C]. 2♀，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，9.IX.2006, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1ex.，木次町木次健康の森，4.X.2003.

【文献記録】島根半島（近木，1980）；浜田市，江津市（富永，1992）；瑞穂町（富永，1993）；邑智町（富永，1993）；瑞穂町（尾原，1994）；隠岐島後（富永，1994）；木次町（近木，1997）；隠岐島後，隠岐島前（西ノ島）（市川・門脇，1998）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；松江市（淀江ほか，2000）；江の川

(中村ほか, 2001); 安来市 (藤井, 2003); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】 本土; 隠岐島後, 島前 (西ノ島).

81. ヒメオンブバツタ *Atractomorpha nipponica*
Steinmann

【文献記録】「大図鑑」において, 島根県産の標本写真が図版に使用されている. 三刀屋町 (日本直翅類学会, 2006).

【県内分布】 本土.

82. ヤマトフキバツタ *Parapodisma setouchiensis*
Inoue

これまでセトウチフキバツタという和名が長く使われてきたが, 「大図鑑」においてこの和名が与えられた.

【標本記録】 1♂, 三瓶山姫逃池 St. 4, 18.X.1991, 門脇久志 leg. 1♂, 大田市三瓶山東の原, 13.VII.1991, 淀江賢一郎 leg. 3♀, 浜田市久代町荒相, 22.IX.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀, Kitano-hara (St. 3) Sanbe-san, 7.VIII.1991, K. Obara leg. 1♀, 隠岐島後: 隠岐の島町大万寺山, 7.VIII.2006, M. Hayashi leg. 1♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 8.-22.VII.2006, MT, M. Hayashi leg. 1♂ 1♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 22.VII.-5.VIII.2006, MT, M. Hayashi leg. 2♂3♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 5.-17.VIII.2006, MT, M. Hayashi leg. 1♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 17.-26.VIII.2006, MT, M. Hayashi leg. 3♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 26.VIII.-9.IX.2006, MT, M. Hayashi leg. 3♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9.-29.IX.2006, MT, M. Hayashi leg.

【撮影記録】 1ex., 平田市鰐淵寺, 10.VIII.2003.

【文献記録】 浜田市, 三瓶山 (富永, 1992); 瑞穂町, 琴引山, 邑智町 (富永, 1993); 隠岐島前 (知夫里島) (富永, 1994); 三瓶山 (門脇, 1994); 瑞穂町 (尾原, 1994); 隠岐島後 (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 松江市 (淀江ほか, 2000); 江の川 (中村ほか, 2001); 佐田町 (尾原ほか, 2001); 隠岐島前 (西ノ島) (下野・市

川, 2004); 隠岐島後 (林ほか, 2006).

【県内分布】 本土; 隠岐島後, 島前 (西ノ島).

83. ハネナガフキバツタ *Ognevia longipennis*
(Shiraki)

【標本記録】 1♂, 三瓶山姫逃池 St. 4, 9.VIII.1991, 淀江賢一郎 leg.

【文献記録】 隠岐島後 (岡田, 1984); 三瓶山 (富永, 1992); 琴引山 (富永, 1993); 三瓶山 (門脇, 1994).

【県内分布】 本土; 隠岐島後.

84. ツチイナゴ *Patanga japonica* (Bolívar)

【標本記録】 1♂, 浜田市久代町荒相, 22.IX.1991, 淀江賢一郎 leg.

【撮影記録】 1ex., 平田市平田森林公園, 22.IX.2003.

【文献記録】 島根半島 (近木, 1980); 浜田市, 江津市 (富永, 1992); 隠岐島後 (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 松江市 (淀江ほか, 2000); 江の川 (中村ほか, 2001); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】 本土; 隠岐島後.

85. ハネナガイナゴ *Oxya japonica* (Thunberg)

【標本記録】 1♂, 大東町山田 (荒井町), 10.VIII.2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C]. 1♂, 出雲市園町沖ノ島, 19.VIII.2005, M. Hayashi leg.

【文献記録】 島根半島 (近木, 1980); 木次町 (近木, 1997); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】 本土; 隠岐? 木村 (1939) と岡部 (1931, 1950) による隠岐の記録は, 同定上の問題がある (市川・門脇, 1998).

86. コバネイナゴ *Oxya yezoensis* Shiraki

【標本記録】 1♀, 三瓶山北の原 St. 3, 7.IX.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀, 三瓶山姫逃池 St. 4, 18.X.1991, 門脇久志 leg. 1♂, 三瓶山姫逃池, 19.X.1991, K. Yodoe leg. 1♂, 三瓶山北の原 St. 3, 27.X.1991, 門脇久志 leg. 1ex., 浜田市久代町荒相, 27.VII.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♂, 大東町山田 (荒井町), 2.

VIII.2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C]. 1♂1♀, 大東町山田 (荒井町), 24.IX.2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C]. 1♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9.IX.2006, M. Hayashi leg. 4♀, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 29.IX.-26.X.2006, MT, M. Hayashi leg. 1♂, 出雲市島村町島村沈下橋斐伊川, 9.IX.2006, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1♂, 斐川町瑞穂大橋斐伊川堤防, 23.VIII.2005.

【文献記録】島根半島 (近木, 1980); 浜田市, 三瓶山 (富永, 1992); 瑞穂町 (富永, 1993); 邑智町 (富永, 1993); 三瓶山 (門脇, 1994); 瑞穂町 (尾原, 1994); 木次町 (近木, 1997); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 松江市 (淀江ほか, 2000); 江の川 (中村ほか, 2001); 安来市 (藤井, 2003); 益田市高津川 (中村・松田, 2005).

【県内分布】本土; 隠岐? 木村 (1932, 1939) と岡部 (1950) による隠岐の記録は再確認の必要性がある (市川・門脇, 1998).

87. セグロイナゴ *Shirakiacris chirakii* (Bolívar)

島根県では改訂版のレッドデータブックで情報不足に指定され, 県内での産地として島根半島, 安来市, 三瓶山, 蟠竜湖, 隠岐が掲載されている (島根県, 2004).

【文献記録】島根半島 (近木, 1980); 隠岐島後 (市川・門脇, 1998); 安来市 (藤井, 2003).

【県内分布】本土; 隠岐島後. 「大図鑑」分布表では隠岐に「?」印がある.

88. ショウリョウバッタ *Acrida cinerea* (Thunberg)

【標本記録】1♂, 三瓶山北の原 St.3, 7.IX.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♂, 浜田市下府町, 22.IX.1991, LT, 尾原・西田・淀江 leg. 1♀, 江津市浅利町奥口, 22.IX.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀, 三瓶山上多根 St.13, 7.IX.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♂, 大東町山田 (荒井町), 10.VIII.2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C]. 1L, 出雲市園町沖ノ島宍道湖グリーンパーク, 9.VII.2005, M. Hayashi leg. 1L, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 22.VII.-5.VIII.2006, MT, M. Hayashi leg. 1♂, 雲南市木次町ふるさと

尺の内公園, 5.-17.VIII.2006, MT, M. Hayashi leg. 3♂, 雲南市木次町ふるさと尺の内公園, 9.IX.2006, M. Hayashi leg.

【文献記録】島根半島 (近木, 1980); 浜田市, 江津市, 三瓶山 (富永, 1992); 瑞穂町, 邑智町 (富永, 1993); 隠岐島後 (富永, 1994); 三瓶山 (門脇, 1994); 瑞穂町 (尾原, 1994); 木次町 (近木, 1997); 隠岐島後, 隠岐島前 (西ノ島) (市川・門脇, 1998); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998); 益田市高津川 (松田・中村, 1999); 松江市 (淀江ほか, 2000); 江の川 (中村ほか, 2001); 佐田町 (尾原ほか, 2001); 安来市 (藤井, 2003); 益田市高津川 (中村・松田, 2005); 隠岐島後 (林ほか, 2006).

【県内分布】本土; 隠岐島後, 島前 (西ノ島).

89. ショウリョウバッタモドキ *Gonista bicolor* (de Haan)

島根県では改訂版のレッドデータブックで情報不足に指定され, 県内での産地として島根半島, 木次町, 三瓶山, 隠岐が掲載されている (島根県, 2004).

【標本記録】1ex., 三瓶山北の原 St.3, 27.X.1991, 門脇久志 leg. 1♂, 三瓶山姫逃池 St.4, 18.X.1991, 門脇久志 leg.

【文献記録】島根半島 (近木, 1980); 三瓶山 (富永, 1992); 木次町 (近木, 1997).

【県内分布】本土; 隠岐? 木村 (1932, 1939) と岡部 (1931, 1950) による隠岐の記録は再確認の必要性がある (市川・門脇, 1998).

90. ナキイナゴ *Mongolotettix japonicus* (Bolívar)

【標本記録】6♀, 大田市三瓶山東の原, 13.VII.1991, 淀江賢一郎 leg.

【文献記録】隠岐島前 (西ノ島) (直翅類研究グループ, 1983); 三瓶山 (富永, 1992); 瑞穂町, 琴引山 (富永, 1993); 三瓶山 (門脇, 1994); 瑞穂町 (尾原, 1994); 斐伊川水系 (淀江ほか, 1998).

【県内分布】本土; 隠岐島前 (西ノ島).

91. ヒロバネヒナバッタ *Stenobothrus funatus* Shiraki

【文献記録】三瓶山（富永，1992）；琴引山（富永，1993）；三瓶山（門脇，1994）。

【県内分布】本土。

92. ヒナバタ *Glyptothorax maritimus maritimus* (Mistshenko)

【標本記録】2♂，三瓶山北の原，23.XI.1991, K. Yodoe leg. 1♂，三瓶山西の原 St.2, 10.XI.1991, 門脇久志 leg. 1♂，北の原，27.X. 2♂1♀，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，9.IX.2006, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1ex., 木次町木次健康の森，20.IX.2003.

【文献記録】琴引山（富永，1993）；隠岐島後，隠岐島前（西ノ島，知夫里島）（市川・門脇，1998）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；江の川（中村ほか，2001）；益田市高津川（中村・松田，2005）。

【県内分布】本土；隠岐島後，島前（西ノ島，知夫里島）。

93. イナゴモドキ *Mecostethus parapleurus* (Hagenbach)

【文献記録】隠岐島後，隠岐島前（知夫里島）（富永，1994）；隠岐島後，隠岐島前（西ノ島，知夫里島）（市川・門脇，1998）。

【県内分布】隠岐島後，島前（西ノ島，知夫里島）。

94. ツマグロバタ *Stethophyma magister* (Rehn)

【標本記録】1♀，三瓶山室の内 St.5, 9.VIII.1991, 大浜祥治 leg. 2♀，三瓶山池田浮布池，7.IX.1991, 三島秀夫 leg. 1♀，三瓶山姫逃池 St.4, 9.VIII.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀，大田市三瓶山東の原，13.VII.1991, 淀江賢一郎 leg. 2♀，三瓶山姫逃池 St.4, 9.VIII.1991, 淀江賢一郎 leg. 2♀，三瓶山北の原 St.3, 7.IX.1991, 淀江賢一郎 leg. 1ex., 浜田市久代町荒相，27.VII.1991, 淀江賢一郎 leg. 2exs., 大東町山田（荒井町），10.VIII.2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C]. 1ex., 大東町山田（荒井町），24.IX.2003, H. Kadowaki leg. [門脇 C]. 1♂，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，22.VII.-5.VIII. 2006, MT, M. Hayashi leg. 1♂，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，5.-17.VIII.2006, MT, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1ex., 木次町木次健康の森，13.IX.2003.

【文献記録】島根半島（近木，1980）；三瓶山（富永，1992）；瑞穂町（富永，1993）；琴引山（富永，1993）；三瓶山（門脇，1994）；瑞穂町（尾原，1994）；木次町（近木，1997）；隠岐島後（市川・門脇，1998）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；松江市（淀江ほか，2000）；江の川（中村ほか，2001）；益田市高津川（中村・松田，2005）。

【県内分布】本土；隠岐島後。

95. マダラバタ *Aiolopus thalassinus tamulus* (Fabricius)

【標本記録】1♂，出雲市園町沖ノ島，19.VIII.2005, M. Hayashi leg.

【文献記録】琴引山（富永，1993）；隠岐島後（市川・門脇，1998）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；江の川（中村ほか，2001）；益田市高津川（中村・松田，2005）；隠岐島後（林ほか，2006）。

【県内分布】本土；隠岐島後。

96. ヤマトマダラバタ *Epacromius japonicus* (Shiraki)

【標本記録】1♂，益田市益田川河口，21.VIII.2004, M. Hayashi leg. 1♂，出雲市大社町神戸川河口右岸，12.XI.2005, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1ex., 江津市敬川町敬川河口の砂浜，19.VII.2004. 1ex., 益田市益田川河口，21.VIII.2004. 1ex., 出雲市大社町神戸川河口右岸，12.XI.2005 (図 1G)。

【県内分布】本土。

97. トノサマバタ *Locusta migratoria* (Linnaeus)

【標本記録】1ex., Mt. Sambe, Shimane, 31.VII.1981, H. Chikaki leg. [近木 C].

【撮影記録】1ex., 三瓶山東の原，30.VII.2005. 1ex., 出雲市西代町斐伊川堤防，20.VIII.2005.

【文献記録】島根半島（近木，1980）；三瓶山（富永，1992）；琴引山（富永，1993）；三瓶山（門脇，1994）；木次町（近木，1997）；隠岐島後，隠

岐島前（西ノ島，知夫里島）（市川・門脇，1998）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；江の川（中村ほか，2001）；安来市（藤井，2003）；益田市高津川（中村・松田，2005）。

【県内分布】本土；隠岐島後，島前（西ノ島，知夫里島）。

98. クルマバッタ *Gastrimargus marmoratus* (Thunberg)

【文献記録】島根半島（近木，1980）；瑞穂町（富永，1993）；瑞穂町（尾原，1994）；木次町（近木，1997）；益田市高津川（松田・中村，1999）；松江市（淀江ほか，2000）；安来市（藤井，2003）。

【県内分布】本土。

99. クルマバッタモドキ *Oedaleus infernalis* Saussure

【標本記録】1♂，Mt. Sambe, Shimane, 31.VII.2006, H. Chikaki leg. [近木 C]. 1ex., 浜田市国分町海浜公園，22.IX.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♂，浜田市国分町海浜公園，22.IX.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♂，Kaihin-koen Hamada-shi, 22.IX.1991, K. Obara leg. 1♂1♀，出雲市園町沖ノ島宍道湖グリーンパーク，6.VIII.2006, M. Hayashi leg. 1♀，出雲市園町沖ノ島宍道湖グリーンパーク，3.IX.2006, M. Hayashi leg. 1♂2♀，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，9.IX.2006, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1ex., 出雲市園町沖ノ島宍道湖グリーンパーク，15.VIII.2003. 1ex., 平田市園町沖ノ島宍道湖グリーンパーク，19.IX.2004.

【文献記録】島根半島（近木，1980）；浜田市（富永，1992）；木次町（近木，1997）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；松江市（淀江ほか，2000）；江の川（中村ほか，2001）；益田市高津川（中村・松田，2005）。

【県内分布】本土。

100. イボバッタ *Trrilophidia japonica* Saussure

【標本記録】1♀，浜田市国分町海浜公園，22.IX.1991, 淀江賢一郎 leg. 1♀，江津市浅利町奥口，22.IX.1991, 淀江賢一郎 leg. 1ex., Asari-cho

Ghotu-shi, 22.IX.1991, K. Obara leg. 1♂，隠岐島後：隠岐の島町隠岐国分寺，8.VIII.2006, M. Hayashi leg. 1♂，雲南市木次町ふるさと尺の内公園，9.IX.2006, M. Hayashi leg.

【撮影記録】1ex., 益田市横田高津川，21.VIII.2004.

【文献記録】島根半島（近木，1980）；浜田市，江津市（富永，1992）；琴引山，邑智町（富永，1993）；隠岐島後，隠岐島前（知夫里島）（市川・門脇，1998）；斐伊川水系（淀江ほか，1998）；益田市高津川（松田・中村，1999）；江の川（中村ほか，2001）；益田市高津川（中村・松田，2005）；隠岐島後（林ほか，2006）。

【県内分布】本土；隠岐島後，島前（知夫里島）。

101. カワラバッタ *Eusphingonotus japonicus* (Saussure)

島根県では，改訂版のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅰ類に指定され，県内での記録として高津川，匹見川，木次町，隠岐が掲載されている（島根県，2004）。

【撮影記録】1ex., 益田市横田高津川，21.VIII.2004（図1H）。

【文献記録】木次町（近木，1997）；益田市高津川（山田，2003）；益田市高津川（林，2005）；桜江町江の川（山本，2006）。

【県内分布】本土；隠岐？木村（1932, 1939）と岡部（1931, 1950）による隠岐の記録は，同定上の問題がある（市川・門脇，1998）。

ま と め

日本直翅類学会（2006）により，島根県からは101種が確実に分布する種として掲載された。この目録を基礎として，各種標本や文献をまとめたところ，新たに11種の記録があった。従って，現時点での島根県産バッタ・コオロギ・キリギリス類は合計112種である。また，疑問種を除いた隠岐の種数は70種である。しかしながら，この112種の中には，同定上の問題を含む記録もあり，今後，実際に野外調査や標本調査で再確認をする必要がある。

文 献

- 近木英哉 (1980)「島根半島の昆虫 (改訂版)」86 p. + 6pls.
- 近木英哉 (1997) 木次町尺の内公園周辺の昆虫相 (1993-1996 年). ホシザキグリーン財団研究報告, (1): 43-52.
- 藤井正治 (2003) 安来市佐久保町の野生生物相第 II 報 コウチュウ目その他の採集目録. すかしば, (51): 17-29.
- 林 成多 (2004) 平田市でクチキコオロギを採集. すかしば, (52): 32.
- 林 成多 (2005)「改訂しまねレッドデータブック」に掲載された直翅類の観察記録. すかしば, (53): 38-39.
- 林 成多 (2006a) 出雲市の海岸で採集したウミコオロギ. すかしば, (54): 29.
- 林 成多 (2006b)「改訂しまねレッドデータブック」に掲載された直翅類の観察記録 (その 2). すかしば, (54): 66-67.
- 林 成多・藤原淳一・島田 孝・米田友祐・六車恭子・成田行弘 (2006) 隠岐諸島の昆虫相に関する一資料-2005 年 8 月 7-10 日に島後で採集・観察した昆虫類の目録. ホシザキグリーン財団研究報告, (9): 245-263.
- 市川顕彦 (1995) 中国地方のヒシバツタ類. すかしば, (41/42): 23-34.
- 市川顕彦 (1996) 島根県からフタツトゲササキリを採集. 比婆科学, (169): 57.
- 市川顕彦 (1997) 日本及び琉球列島のカマドウマ類. ホシザキグリーン財団研究報告, (1): 67-76.
- 市川顕彦 (2002) 島根県多伎町に生息するウミコオロギについて. 月刊むし, (377): 48.
- 市川顕彦・門脇久志 (1998) 隠岐諸島の直翅類. すかしば, (46): 47-55.
- 門脇久志 (2004) 三瓶山のバツタ類.「三瓶山の昆虫類とその保全」: 17-19. 島根県昆虫研究会.
- 木村康信 (1932) 島前に於ける動植物分布. 概観島前地誌 (付録). (未見)
- 木村康信 (1939) 隠岐黒木村ニ分布セル動植物目録 (謄写自刊). (未見)
- 松田 賢・中村慎吾 (1999) 島根県高津川の昆虫類. ホシザキグリーン財団研究報告, (3): 57-119.
- 中村慎吾・亀山 剛・片山舜輔 (2001) 江の川の昆虫類. ホシザキグリーン財団研究報告, (5): 17-114.
- 中村慎吾・松田 賢 (2005) 島根県高津川の昆虫類, 2000 年の調査結果. ホシザキグリーン財団研究報告, (8): 99-172.
- 日本直翅類学会 編 (2006)「バツタ・コオロギ・キリギリス大図鑑」687p. 北海道大学出版会.
- 尾原和夫 (1994) 瑞穂町の直翅型昆虫類.「島根県瑞穂町の昆虫類」: 13-15. 島根県昆虫研究会.
- 尾原和夫・三島秀夫・淀江賢一郎 (2001) 島根県佐田町高津屋農道の昆虫類. ホシザキグリーン財団研究報告, (5): 139-160.
- 岡部武夫 (1931) 隠岐島の動植物. 島根教育, (430): 10-15. (未見)
- 岡部武夫 (1950) 隠岐雑俎. 隠岐郷土選書, (2): 17-29. (未見)
- 岡田正哉 (1984) 竹節虫を調べやう 5. ぱったりぎす, (61): 1972-1983.
- 大浜祥治 (2006) 島前速報! いずも虫だより, (100): 870-871.
- 島田 孝 (2004) 隠岐のクチキコオロギとアオマツムシ. すかしば, (52): 31-32.
- 下野誠之・市川顕彦 (2004) 隠岐の若干の直翅類. ぱったりぎす, (136): 51.
- 富永 修 (1992) 島根県 (三瓶山・浜田市+江津市) の直翅類雑録. ぱったりぎす, (95): 14-18.
- 富永 修 (1993) 島根県の直翅類 II. ぱったりぎす, (98): 41-43.
- 富永 修 (1994) 隠岐島の直翅類の記録. ぱったりぎす, (101): 5-7.
- 直翅類研究グループ (1983) 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録第 15 集「日本の直翅類」101 p. 大阪市立自然史博物館.
- 山田 学 (2003) 匹見川・高津川にてカワラバツタの生息を確認. すかしば, (51): 30.
- 山田 学 (2004) 益田市のクチキコオロギ・ウミコオロギ類の採集記録. すかしば, (52): 30-31.

山本正志（2006）島根県中部地域（江の川流域）
におけるカワラバッタの採集・観察記録．す
かしば，（54）：58．

矢代 学・市川顕彦（2002）島根県多伎町でハマ
スズを発見．月刊むし，（372）：48．

淀江賢一郎・星川和夫・斉藤光男・門脇久志・尾
原和夫（1998）島根県斐伊川水系の昆虫類

（1997年の調査結果）．ホシザキグリーン財団
研究報告，（2）：7-86．

淀江賢一郎・星川和夫・門脇久志・尾原和夫・三
島秀夫（2000）松江市円木池とその周辺の昆
虫類．ホシザキグリーン財団研究報告，（4）：
161-192．